

ACQUIRED
"L'Echange", Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC, Rédacteur

Opuscula martialia

X

(22 juillet 1943)



MOULINS

" LES IMPRIMERIES RÉUNIES "

15, RUE D'ENGHEN, 15

Les nouveautés de ce fascicule, avec les espèces anciennement nommées par moi qui y figurent, se trouvent dans ma collection représentées au moins par les *types*.

Strangalia quadrizona v. n. anticejuncta [Long.].
Macula basalis et fascia antemediana rufis elytrorum pro parte junctis. Chine.

S. Lajoyei n. sp. Elongatus, postice attenuatus, uniformiter non dense griseo-luteo pubescens, niger, thorace infra reducte, abdomine pro parte, femoribus diverse, tibiis pro parte et articulis ultimis antennarum ad basin rufis, elytris nigris, in singulo ad basin interne luteo maculatis, ante et post medium luteo fasciatis, et ad apicem luteo notatis, his apice oblique truncatis, externe longe dentatis. L. 16 mill. Japon. — Par sa pubescence, se rapproche de *vicaria* Bat., mais les dessins des élytres sont différents.

S. biluteomaculata n. sp. Elongatus, postice attenuatus, uniformiter non dense griseo-luteo pubescens, niger, elytris in singulo externe ante et post medium luteo maculatis, his apice oblique truncatis et externe dentatis, articulis ultimis antennarum ad basin luteis. L. 15 mill. Japon. — A placer près de *vicaria* Bat.

S. Aurivillei v. n. testaceiceps. Rufo-testaceus, elytris apice pygidioque nigris, antennis, tarsi, tibiis intermediis pro parte et posticis nigris. Tonkin.

Ceresium elongatum n. sp. [Long.]. Valde elongatus, nitidus, supra sparse, infra pro parte dense albo pubescens, thorace minute luteo maculato, castaneus, antennis, pedibus (femoribus apice brunneis) abdomineque luteis; thorace elongato, inæquale punctato; antennis

elongatis, articulis 1° et 3° fere æqualibus, 4° brevior; scutello dense luteo pubescente; elytris elongatis, parallelis, sat fortiter et dense, postice minute et sparse, punctatis; pedibus elongatis, femoribus diverse clavatis. L. 17 mill. Australie. — Espèce caractérisée par sa grande taille et sa forme allongée.

C. rufoapicale n. sp. Elongatus, subopacus, sparse griseo pubescens, nigro-piceus, elytris apice abdomine membrisque rufis, femoribus apice piceis, scutello dense albo pubescente. Long. 14 mill. Bornéo. — Voisin de *furtivum* Pasc., caractérisé par la coloration foncée du dessus avec l'extrémité des élytres plus claire.

C. brevipes n. sp. Parum elongatus, nitidus, pro parte dense, pro parte sparse griseo-luteo pubescens, nigro-piceus, elytris membrisque rufescentibus; articulis 3°-4° antennarum fere æqualibus; thorace parum lato, in disco pro parte læve, lateraliter pro parte dense pubescente; scutello dense luteo pubescente; pedibus brevibus et robustis, femoribus valde clavatis. L. 11 mill. Bornéo. — Espèce très distincte par ses pattes courtes et robustes.

C. curtipenne n. sp., de Birmanie, voisin du précédent, mais plus robuste, avec les pattes moins courtes, le 3° article des antennes un peu plus long que le 4°, le thorax plus large, en partie densément pubescent de jaune sur les côtés avec la coloration générale plus claire, roussâtre. L. 15 mill.

C. Wittmeri n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, sparse griseo pubescens, scutello et infra corpore dense albo pubescentibus, thorace lateraliter antice et postice griseo-maculato; articulo 3° antennarum 4° paulo longiore; thorace parum elongato; pedibus sat brevibus,

femoribus valde dilatatis. L. 9 mill. Ile Saleier. — Paraît voisin de *subuniforme* Sc. et en différer au moins par le 3^e article des antennes plus long que le 4^e.

C. tonkinense n. sp. Parum elongatus, subnitidus, sparse griseo pubescens, rufo-testaceus, articulo 3^o antennarum 1^o et 4^o longiore, antennis corpore longioribus ; thorace sat breve, lateraliter subarcuato, antice transverse sulcato et depresso, punctato et plicato ; scutello dense luteo pubescente ; femoribus elongatis, clavatis. L. 11 m. Tonkin. — Peut se placer près de *subuniforme* Sc., caractérisé par la structure de son prothorax.

C. Perroudi n. sp. Elongatus, parum nitidus, sparse griseo pubescens, rufo-brunnescens, infra corpore obscuriore, membris pallidioribus ; articulo 3^o antennarum 1^o et 4^o longiore, antennis corpore longioribus ; thorace parum elongato, supra diverse plicato et granuloso ; scutello non dense pubescente ; elytris in disco vage costulatis. L. 15 mill. Cochinchine. — A placer près de *Jeanvoinei* Pic.

C. Rouyeri n. sp. Elongatus, diverse nitidus, niger, sparse griseo pubescens, thorace postice, scutello et infra corpore dense albo pubescentibus. L. 11 mill. Java. — Par sa coloration foncée, voisin de *rarepilum* New mais pubescence en partie espacée, en partie densément disposée.

Epipedocera sinuatipennis n. sp. [Long.]. Niger, supra opacus, scutello et infra corpore lateraliter multi albo notatis, elytris ad medium reducte eburneo fasciatis, apice oblique sinuatis, non spinosis ; thorace minute et densissime punctato. L. 13 mill. Indes : Walardi. — Voisin de *affinis* Ch., s'en distingue par la ponctuation plus fine du thorax, l'apex des élytres particulier, l'abdomen marqué de blanc.

E. subnitida n. sp. Niger, parum nitidus, scutello albo, thorace infra et pectore lateraliter albo notatis, elytris ad medium anguste eburneo fasciatis, femoribus ad basin rufis. L. 7 mill. Laos. — Voisin de *affinis* Ch., en diffère par le dessus un peu brillant, les cuisses teintées de roussâtre.

Erythrus longipennis n. sp. [Long.]. Elongatus, postice paulo latior, niger, capite, thorace (illo nigro bituberculato et nigro 4-signato) elytrisque aurantiacis, coxis intermediis luteis. L. 23 mill. Java. — Espèce distincte entre toutes par ses élytres très longs, munis d'une longue épine suturale et faiblement bicostés.

Genre **Erythrus** W. Moins *E. apicalis* Pic à sommet des élytres foncé, et *atripennis* Pic à élytres noirs avec une macule basale rouge, toutes les espèces, originaires de Chine ou de l'Indochine, nommées par moi, ou nouvelles, possèdent des élytres orangés ou plus ou moins pourprés concolores, et se distinguent entre elles de la façon suivante : **4-signatus**, de Chine, allongé, noir avec le thorax en dessus et en dessous et élytres d'un rouge orangé, le premier ayant 4 macules noires discales, les antérieures étant un peu arquées ou allongées. **4-maculatus**, de Hanoï, analogue au précédent avec les élytres un peu carminés et ayant leur angle sutural terminé par une dent pointue très marquée, tandis que, chez le précédent, cet angle est courtement denté avec la dent parfois émoussée. **Lineatus**, de Chine, semblable au précédent, mais en différant par les dessins noirs du thorax, composés d'une ligne ondulée de chaque côté du disque avec un point postérieur externe. La coloration est noire sous le dessous du corps, la tête et l'écusson avec le reste du dessus du corps pourprés ou orangé, le thorax étant diversement marqué de noir chez les 4 suivants, se distinguant entre eux. **Angustatus**, de Chine,

à forme allongée, subparallèle, antennes assez grêles, avec le thorax à 3 macules discales (2, 1) noires triangulairement disposées. **Multimaculatus**, de Chine, de couleur carmin sur les parties claires, à forme étroite et ayant le thorax orné, de chaque côté, de 4 macules noires, 2 en dessus, 2 latérales. Puis deux variétés de *Fortunei* W., de Chine, la var. **bijunctus**, ayant les macules discales jointes et, en plus, des macules latérales ; la var. **multiplicatus**, ayant 4 macules de chaque côté et en plus une médiane postérieure. Enfin deux formes caractérisées par l'écusson plus clair, roux, parfois un peu brunâtre, ont l'avant-corps diversement roux en dessus et dessous et se rapprochent ainsi de *Championi* W. avec la forme plus allongée des élytres et les dessins noirs du thorax différents. **Fruhstorferi**, du Tonkin, à écusson roux avec 2 macules noires sur le disque du thorax ; **biimpressus**, de Chine, à écusson roux brunâtre, °élytres moins longs avec le thorax ayant 4 macules discales placées 2 à 2 sur la partie antérieure de cet organe qui, de plus, est biimpressionné en dessus.

Demonax rufobasalis n. sp. [Long.]. Sat angustatus, opacus, rufus, elytris pro parte griseo fasciatis et in singulo ante et ad medium externe nigro 4-maculatis, postice nigro fasciatis, membris nigris, articulo 1° et ultimis antennarum femoribusque diverse rufis. L. 11 mill. Basilan. — Espèce très caractérisée par sa coloration générale rousse et ses dessins élytraux. Sans doute voisin de *mustela* Pasc.

Bruchus (Acanthoscoelides) sublineatus nov. [Bruchide]. Oblongus, niger, regulariter non dense griseo pubescens, thorace medio supra plus minusve albo aut griseo lineato. L. 2 mill. Congo. — Voisin de *lineatopygus* Pic, en diffère par le pygidium uniformément pubescent, les élytres sans ligne suturale blanche nette.

B. (Ac.) Nodieri n. sp. Oblongus, niger, regulariter non dense griseo pubescens ; thorace elongato, antice valde attenuato et lateraliter distincte depresso ; elytris latis et brevibus. L. 2,5 mill. Gabon. — Ressemble au précédent, mais sans ligne blanche au thorax.

B. (Ac.) Vinsoni nov. Oblongo-elongatus, niger, regulariter sat dense griseo albo pubescens ; thorace sat breve, antice attenuato et lateraliter impresso-strangulato ; antennis brevibus, pro parte depressis ; elytris parum latis et brevibus. L. 3 mill. Ile Maurice. — Voisin de *obscurus* Fhs. et en différant, au moins comme variété ; thorax plus court que chez le précédent.

B. (Ac.) Antonioi n. sp. Oblongus, opacus, niger, regulariter supra sat sparse griseo pubescens ; antennis latis et brevibus ; thorace obconico, antice valde attenuato, pro parte late et dense punctato ; scutello minuto, dense albo pubescente ; elytris sat latis et brevibus, fortiter striatis, intervallis sat fortiter lineato punctatis. L. 4,5 mill. Congo. — A placer près de *strangulatus* Fhr., thorax plus court, à sculpture moins forte.

B. multipunctatus mihi, d'Abyssinie, analogue au précédent et entièrement noir aussi, s'en distingue, à première vue, par les antennes plus longues et surtout la sculpture des élytres dont les intervalles sont ornés de nombreux points.

Cerocamptus Fouqueti n. sp. [Héter.]. Oblongo-elongatus, nitidus, rufus, capite thoraceque pro parte viridescentibus, pedibus rufis, femoribus apice late et tibiis ad basin viridibus ; thorace transverso, minute et sparse punctato ; elytris mediocre striatis, apice attenuatis. L. 24 mill. Pondichéry. — Espèce très distincte par sa coloration particulière.

Campsimorpha imperialis v. nov. **Jeanvoinei** [Hé-

tér.]. Elytris in disco violaceo purpureo aut cyaneo coloratis, ad suturam et externe viridescentibus, lateraliter rubro-cupreo marginatis. Tonkin.

Camariomorpha singularis v. nov. reducta [Héter.]. Diffère de la forme typique par les élytres plus courts, le thorax à angles antérieurs simples, un peu proéminents. Java.

C. javana v. nov. latior. Parum elongatus et latus, pro majore parte æneus, elytris purpureo lineatis, lineis obscure punctatis. Java.

Camaria Madoni n. sp. [Héter.]. Oblongo-elongatus, nitidus, viride olivaceus, elytris purpureis, anguste viride vittatis, vittis purpureo notatis et punctatis, elytris sat latis, postice attenuatis, apice paulo impressis. L. 17 mill. Brésil. — A placer près de *boliviensis* Pic, qui est autrement coloré.

C. transversesulcata n. sp. ♂. Elongatus, nitidus, olivaceus, capite thoraceque minute, diverse, sparse punctatis, illo transverso, angulis anticis rotundatis; elytris elongatis, postice attenuatis, nitidis, ad apicem externe opacis, non fortiter striatis, transverse multi reducte et diverse sulcatis; pedibus elongatis, tibiis anticis curvatis et apice dilatatis, posticis intus longe spinosis. L. 23 mill. Brésil. — Voisin de *subopacipennis* Pic, très caractérisé par sa sculpture élytrale.

C. curticornis n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, olivaceus, elytris cupreis, infra corpore pro parte viride, pedibus subolivaceis; antennis brevibus; capite thoraceque subalutaceis, minute et sparse punctatis; thorace valde transverso, lateraliter fere recto, angulis anticis nullis, rotundatis, postice sinuate sulcato; elytris convexis, thorace paulo latioribus, postice attenuatis, apice breve incis et rotundatis, parum fortiter

et fere complete striato-punctatis, striis apice minutis, intervallis subconvexis; pedibus parum elongatis. L. 20 mill. Paraguay. — A placer près de *subrufescens* Pic, élytres plus foncés, à stries moins marquées et en partie presque effacées à l'extrémité.

Rhipidius angusticollis n. sp. [Héter.]. Un peu brillant, brun ferrugineux avec parties un peu plus claires, élytres marqués de jaune vers les épaules, 2^o et 3^o articles des antennes, ceux-ci larges, et base des rameaux ainsi que les hanches et la base des cuisses jaunes; tête étroite et allongée avec les yeux rapprochés, grands; thorax long, peu large à la base, bien plus étroit que les élytres, progressivement rétréci en avant, angles postérieurs peu prononcés; écusson large, peu ponctué; élytres très séparés, assez longs et étroits, nettement reborchés, longuement creusés vers l'extrémité. L. 6 mill. Bornéo. — A placer près de *longicollis* Sch., en diffère par les premiers articles des antennes larges, les élytres no concolores, etc...

Pseudopyrochroa curteapicalis n. sp. [Héter.]. Elongatus, subdepressus, niger, supra, capite antice excepto, purpureus; capite inter oculos elevato, postice paulo attenuato; antennis latis, longe pectinatis; elytris elongatis, parallelis, costulatis, rubris, apice anguste nigro marginatis. L. 12 mill. Bornéo. — Voisin de *apicipennis* Bl., élytres plus étroitement noirs au sommet, avant-corps en partie clair.

P. multiimpressa n. sp. ♂. Elongatus, niger, supra aurantiacus, parum nitidus. L. 10 mill. Bornéo. — Ressemble à *impressiceps* Pic, mais avant-corps moins brillant, tête plus longue, thorax nettement et multi impressionné, les impressions dissemblables.

P. nigripennis mihi, de Malacca, voisin du précé-

dent, est un peu plus étroit, ayant les antennes plus longuement flabellées, le thorax peu impressionné, la coloration noire, sauf la tête et le thorax qui sont roux. Parfois, la tête est en partie foncée (*v. n. notaticeps*). J'attribue comme ♀ à ces ♂ des exemplaires à coloration semblable, mais ayant les antennes simples avec leur article terminal blanc.

P. atricolor n. sp. Elongatus, niger, opacus, antennis depressis et pectinatis ♀ ; thorace medio sulcato, elytris distincte costatis. L. 10 mill. Malacca. — Voisin de *nigricolor* Pic, thorax moins large, élytres nettement costés.

P. uniformis nov. Voisin du précédent, de la même provenance et entièrement noir, s'en distingue par le thorax plus large, les articles des antennes angulés au sommet, au lieu d'être en partie émoussés. Le ♂ a les antennes épaisses et longuement flabellées.

P. modesta n. sp. ♂. Angustatus, parum nitidus, niger, capite, thorace, scutello elytrisque antice rubris ; capite inter oculos paulo elevato, antice impresso ; antennis parum latis, flabellatis ; thorace breve et angustato, supra diverse impresso ; elytris parallelis. L. 7 mill. Malacca. — A placer près de *sulcaticeps* Pic, élytres plus longs, de coloration différente.

P. atriceps n. sp. ♀. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace, scutello elytrisque rubris, capite inter oculos impresso ; antennis depressis, pectinatis ; thorace breve, parum lato, medio sulcato et lateraliter impresso. L. 11 mill. Malacca. — Voisin de *inapicalis* Pic, en diffère par la tête foncée, les élytres moins longs.

Indanerces grandis n. sp. [Héter.]. Major, elongatus, holosericeo pubescens, niger, elytris dimidio antice au-

rantiacis. L. 9 mill. Bornéo. — Espèce caractérisée et distincte des espèces connues par sa grande taille et l'avant-corps robuste.

I. luteobasalis n. sp. Angustatus, niger, elytris dimidio antice luteis. L. 7 mill. Java. — Ressemble au précédent par son mode de coloration, mais plus gracile, avant-corps non robuste avec le thorax nettement impressionné.

I. ater n. sp. Valde angustatus et elongatus, holosericeo pubescens, niger; thorace elongato et impresso. L. 9 mill. Malacca. — Très distinct par sa coloration générale noire, jointe à sa forme très allongée.

Mimoncomera longiceps n. sp. [Héter.]. Angustatus, parum nitidus, pallido testaceus, capite inter oculos (his paulo distantibus), palpis pro parte et tibiis ad basin brunneis, elytris apice minute brunneo notatis, tibiis anticis inermibus. L. 12 mill. Java. — Distinct de *ocularis* Pic par la tête plus longue, les yeux moins saillants et un peu écartés.

Eobia Drescheri n. sp. [Héter.]. Elongatus, nitidus, concolor, testaceus, articulo ultimo antennarum externe inciso. L. 11 mill. Java. — Espèce caractérisée par sa forme allongée, le dessus plus brillant que d'ordinaire.

Borchmania latior n. sp. [Héter.]. Elongatus, elytris sat latis, niger, capite ad oculos thoraceque rufo-testaceis; elytris nigro-violaceis, ad basin late rufo-testaceis. L. 10 mill. Java. — Voisin de *reducta* Pic, mais élytres plus larges, thorax aussi, antennes plus aplaties.

B. binotaticollis n. sp. Elongatus, niger, thorace aurantiaco notato, elytris aurantiacis, ad suturam et apice anguste nigro-violaceo marginatis, ad humeros breve violaceo tinctis. L. 10 mill. Malacca. — Voisin de *nigrifinis*

Br., élytres plus longs, marqués de foncé aux épaules, thorax moins court, etc...

Macrotomoderus niger n. sp. [Héter.]. Oblongolongatus, nitidus, brevis hirsutus, sat minute et parum dense punctatus, niger, capite antice, pedibus pro parte et abdomine rufis. L. 4,5 mill. Bornéo. — Moins robuste que *latipennis* Pic, moins fortement ponctué et coloration différente.

Anthicomorphus olivaceus n. sp. [Héter.]. Angustatus, nitidus, rufescens, supra nigro-olivaceus, luteo pubescens, antennis pro parte pedibusque testaceis, femoribus apice nigris. L. 4 mill. Malacca. — Plus allongé que *niponicus* Lew., avec les pattes bicolores.

Hylophilus latecephalus n. sp. [Héter.]. Minutus, oblongus, testaceus, supra paulo brunnescens, holosericeo pubescens, elytris antice in disco irregulariter denudatis, postice transverse denudate fasciatis ; capite latissimo, postice subarcuato, oculis magnis, valde separatis ; antennis brevibus ; thorace antice externe paulo angulato ; elytris sat latis et brevibus. L. 1 mill. Malacca. — Ressemble à *Francoisi* Pic, tête plus large, coloration moins foncée, dessins dénudés différents.

H. bidenudatus n. sp. Oblongus, griseo holosericeo pubescens, nigro piceus, capite, thorace et infra corpore pro parte rufis, membris testaceis, antennis apice femoribusque posticis brunnescentibus, capite postice subarcuato, oculis distantibus ; thorace brevis, sat lato, dense punctato ; elytris sat latis et brevibus, in singulo et in disco premedium denudato maculatis. L. 2 mill. Malacca. — Voisin de *subpruinosis* Pic, caractérisé par les macules dénudées subarrondies des élytres.

Anthicus flavicolor n. sp. [Héter.]. Angustatus, nitidus, parum pubescens, elytris postice piceo fasciatis et

apice piceo notatis. L. 2 mill. Malacca. — Voisin de *monstrosicornis* Mars., par la structure des antennes, mais coloration plus pâle.

A. pahanganus mihi, avec un dessin analogue au précédent, mais de coloration rousse, a le thorax plus fortement élargi en avant, les élytres moins étroits.

Deux *Platerodrilus* Pic [Drilidæ], nommés par moi, sont suffisamment caractérisés par les caractères suivants : **inapicalis**, de Sumatra, de forme étroite et allongée, noir, avec les élytres orangés et l'avant-corps en partie roux ; **piceicollis**, de Bornéo, de forme peu allongée, noir, avant-corps de poix, élytres orangés avec un peu moins de la moitié apicale noire.

Genre *Drilonius* Pic [Drilidæ]. A distinguer dans ce genre les espèces suivantes : **basalis**, de Bornéo, noir avec les élytres longuement pourprés en avant, les cuisses plus ou moins jaunes ; **Raffrayi**, de Singapore, brun-roussâtre avec les élytres teintés de jaune à la base, la base des antennes et les pattes en partie testacés ; **lineaticeps**, de Chine, voisin du précédent avec la tête rousse au moins au milieu, les antennes à base foncée et subflabellées, au lieu d'être pectinées.

Genre *Stenocladus* Frm. [Drilidæ]. A distinguer dans ce genre les espèces suivantes : **testaceus**, de Malacca, de forme étroite, entièrement testacé, sauf antennes, moins les deux premiers articles, noires, celles-ci longuement flabellées, de 9 mill. ; **basipennis**, de Malacca, petit, allongé, noir, fuligineux, avec les côtés du thorax, les 2 premiers articles des antennes, une macule humérale, dessous moins abdomen et pattes, moins tibias et tarsi postérieurs en partie rembrunie, testacés, antennes un peu robustes, de 3,5 mill. ; **obscuripes**, de Bornéo, allongé, roux, un peu brunâtre sur l'avant-corps, élytres

noirs-fuligineux à base largement orangée, dessous testacé avec l'abdomen obscurci postérieurement, membres foncés, cuisses testacées en dessous, de 6 mill.

Gorhamia obscura n. sp. [Drilide]. Angustatus, nitidus, castaneus, infra corpore pro parte et femoribus testaceis ; antennis parum latis, elongatis ; thorace transverso, sparse pupillato-punctato ; elytris elongatis, antice et postice paulo attenuatis, minute punctatis et vage costulatis, antice externe impressis et explanatis. Long. 8 mill. Bornéo. — Très caractérisé par sa coloration foncée, jointe à sa forme très allongée.

G. minuta mihi, de Bornéo, de coloration générale brunâtre, avec quelques parties plus claires, se distingue nettement du précédent par les élytres plus courts, subparallèles, brièvement marqués de jaune aux épaules, à sculpture moins fine, le thorax plus transversal, les antennes plus larges.

Rhipidiodrillus n. gen. [Drilide]. Antennis brevibus, flabellatis, elytris dehiscentibus, abdomine et aliis brevioribus, pedibus robustis, articulis ultimis palparum sat brevibus, acuminatis. Fascies de *Ceylanodrillus* Pic, très distinct par la structure des antennes et des élytres. — Genre établi pour l'espèce suivante.

R. atricolor n. sp. Parum elongatus, antice et postice attenuatus, longe griseo pubescens, nitidus, niger, capite antice, articulis 2 primis antennarum, infra corpore pedibusque flavo-testaceis, tibiis et tarsis posticis obscuratis ; capite breve, oculis grandis, prominulis ; articulo 3° antennarum lato, triangulare, sequentibus late flabellatis ; thorace parum breve, antice paulo attenuato, sat fortiter et sparse punctato ; elytris thorace vage latioribus, longe dehiscentibus, apice attenuatis, marginatis, dense ruguloso-punctatis. L. 5 mill. Malacca.

Plutonesthes atricollis n. sp. [Long.]. Elongatus, postice latior, nitidus, niger, elytris dense purpureo pubescentibus, his antice parallelis, non carinatis; thorace pro parte paulo aurantiaco pubescente; pedibus diverse elongatis. Long. 9 mill. Java. — Voisin de *crocata* Pasc., en diffère par le thorax noir, les élytres moins longs et non sensiblement étranglés.

Glenea Pieli n. sp. [Long.]. Parum elongatus, postice attenuatus, nitidus, sat uniformiter parum dense griseo pubescens, niger, elytris in disco late rufis, pedibus testaceis; thorace anguste albo trivittato; elytris immaculatis. L. 5 mill. Chine. — Voisin de *relicta* Bat., caractérisé par les élytres sans macules blanches.

G. Magdelainei n. sp. Angustatus, niger, pro parte glaber, supra fulvo-luteo, infra griseo, pubescens, thorace medio et lateraliter, elytris ad suturam et externe reducte luteo-fulvo lineatis, his ad medium luteo maculatis, femoribus rufis. L. 11 mill. Annam. — Voisin de *mathematica* Ths., en diffère par les cuisses rouges, la macule médiane supplémentaire des élytres.

G. internedivisa n. sp. Angustatus, niger, supra luteo aut griseo signatus, infra pro parte albo pubescens, antennis nigris, capite quadri, thorace quinque et elytris in singulo quadri lineatis, linea interna reducta et postice divisa, pedibus rufis (forma typica), aut femoribus nigris et vitta interna prolongata, plus minusve completa (v. nov. *subregularis*). L. 10-12 mill. Tonkin. — Voisin du précédent et aussi de *glaucescens* Aur.

G. Reitteri n. sp. Elongatus, niger, elytris pro parte rufis, supra luteo signatus, infra luteo et albido pubescens, capite bi et thorace tri luteo lineatis; elytris luteo, intus non regulariter, multi lineatis, post medium ad suturam et in disco posteriore luteo maculatis, antennis

pro parte et pedibus rufis. L. 12 mill. Chine. — Voisin du précédent.

G. flavimembris n. sp. Elongatus, postice attenuatus, dense luteo-sulphureo pubescens, signaturis piceis ornatus : linea inter oculos, linea mediana thoracis T formata et macula externa utrinque ; elytris in singulo et in disco antice uni maculatis, postice bimaculatis, ante medium oblique et ad medium transverse fasciatis, membris flavo-testaceis. L. 5 mill. Java. — Voisin de *W. vittata* Pic, dessins différents.

G. luteosignata n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, niger, elytris rufis, apice obscuris, pedibus rufis ; capite postice bi et thorace tri luteo vittatis, elytris in singulo luteo quinque maculatis, his longitudinaliter, sat irregulariter, dispositis. L. 14 mill. Yunnan. — Voisin de *relicta* Pasc., mais dessins pubescents jaunâtres.

G. relicta v. n. **unilineata**. Thorace uni albo lineato, illo sat robusto. Chine, Japon.

G. Salvazai n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, niger, elytris ad basin rufo tinctis, capite, thorace lateraliter et infra corpore pro majore parte dense albo-pubescentibus, elytris in singulo albo quinque maculatis, thorace medio albo lineato. L. 6 mill. Laos. — Voisin de *stictica* Bat., pattes plus foncées et thorax autrement marqué de blanc.

G. Theresæ n. sp. Elongatus et parum robustus, nigro-cyaneus, thorace albo-luteo sex maculato, elytris in singulo diverse quinque albo-luteo maculatis, maculis 2 ante et 2 post medium valde oblique dispositis, macula transversa anteapicalis, apice truncatis et externe paulo dentatis, pedibus pro majore parte rufis. L. 22 mill. Cochinchine. — Jolie espèce, voisine de *Pulchella* Ths., plus robuste avec les macules nettes et en partie grosses.

G. atropubens n. sp. Elongatus, pro parte niger et cyaneus, supra pro parte dense nigro pubescens, albo maculatus, infra pro parte albo notatus, pedibus rufis ; thorace subquadrato, longitudinaliter albo binotato ; scutello albo ; elytris elongatis, postice attenuatis, apice truncatis et paulo angulatis, in singulo albo quinque maculatis, longitudinaliter dispositis. L. 23 mill. Tonkin. — Voisin du précédent avec les dessins différents, la coloration plus sombre.

G. Thomsoni v. n. **lunulofasciata**. Nigro-violaceus aut cyaneus, pro parte albo pubescens, thorace uni, elytris tri albo fasciatis, fasciis 1^a et 2^a arcuate dispositis. L. 16 m. Batjian. — Diffère de *Thomsoni* Pasc. par les bandes blanches, et non jaunes, sur le milieu des élytres.

G. Adunaria n. sp. Angustatus, niger, pro parte albo pubescens, thorace albo pubescente, in disco nigro bimaculato, maculis elongatis ; scutello albo ; elytris nigris, ad suturam et externe albo vittatis, ad basin in disco albo maculatis et ad medium interne reducte albo fasciatis, apice albo notatis, pedibus rufescentibus. L. 10 mill. ? Indes Or. — A placer près de *bisbivittata* Aur.

G. externerufa n. sp. Elongatus, niger, supra opacus, elytris lateraliter rufis et nitidis, pedibus pro majore parte rufis ; thorace medio et lateraliter albo vittato ; scutello albo ; elytris ad medium transverse albo notatis, ad apicem albo maculatis. L. 12 mill. Sumatra. — Ressemble à *manta* Pasc., en diffère par le thorax orné de bandes longitudinales blanches.

M. PIC.

Autorisation Pb 810

